

Alteraciones y tratamientos que alteran la conducción



Bidebarrieta , mayo 2017

CARRETILLAS



Alteraciones Físicas habituales a descartar:
espondilopatías severas, epicondilitis, osteoporosis severa, hipoacusias SAL >45 db=>D(dificultad aún levantando la voz), alteraciones visuales (ojo vago, visión monocular, campo visual =>80° ojo mejor) *7/10 corregida antigua NTP 210*, desequilibrio, mala coordinación. Apneas nocturnas no tratadas.

CARRETILLAS



Alteraciones Psicológicas a descartar: fobia específica, drogadicción.

TRATAMIENTOS QUE AFECTAN A LA CONDUCCIÓN DE CARRETILLAS



EN PRINCIPIO TODOS

AGENCIA ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS



https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/home.htm



Información importante sobre cookies

La web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Disponible más información acerca de las cookies y cómo impedir su uso en nuestra Política de cookies.](#)

Bienvenidos | Bevinguts | Ongi etorri | Benvidos | Bevinguts | Welcome

Buscar

Síguenos:

La AEMPS | Medicamentos de uso humano | Medicamentos veterinarios | Productos sanitarios | Cosméticos e higiene | **Industria**

Inicio > Industria > Etiquetado y prospectos > Medicamentos y conducción

La incorporación del pictograma de conducción en los envases de medicamentos

Compartir:

Última actualización: 18/05/2016

[Normas generales de interpretación de los listados](#)

| Código ATC del Grupo | Descripción del Grupo | Estado de revisión | Fecha de última modificación |
|----------------------|--|--------------------|------------------------------|
| Grupo A | Tracto alimentario y metabolismo | Completada | 18/05/2016 |
| Grupo B | Sangre y órganos hematopoyéticos | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo C | Sistema cardiovascular | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo D | Dermatológicos | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo G | Sistema genitourinario y hormonas sexuales | Completada | 12/03/2014 |
| Grupo H | Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas | Completada | 29/06/2012 |

- Dispositivos de seguridad de medicamentos de uso humano
- CIMA: Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS
- Notas informativas
- Principios activos
- Inspección de normas de correcta fabricación
- Inspección de buenas prácticas de laboratorio
- Inspección de buena práctica clínica
- Inspección de buenas prácticas de farmacovigilancia
- Distribución de medicamentos y Catálogo de entidades de distribución
- Comercio exterior
- Productos sanitarios
- Productos cosméticos y de higiene personal
- Farmacovigilancia humana
- Tasas
- Investigación clínica
- Presentación medicamentos pediátricos
- Circulares

Última actualización: 18/05/2016

Listados de principios activos por grupos ATC* e incorporación del pictograma de la conducción

[Normas generales de interpretación de los listados](#)

| Código ATC del Grupo | Descripción del Grupo | Estado de revisión | Fecha de última modificación |
|----------------------|--|--------------------|------------------------------|
| Grupo A | Tracto alimentario y metabolismo | Completada | 18/05/2016 |
| Grupo B | Sangre y órganos hematopoyéticos | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo C | Sistema cardiovascular | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo D | Dermatológicos | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo G | Sistema genitourinario y hormonas sexuales | Completada | 12/03/2014 |
| Grupo H | Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas | Completada | 29/06/2012 |
| Grupo J | Antinfeciosos para uso sistémico | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo L | Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo M | Sistema musculoesquelético | Completada | 12/03/2014 |
| Grupo N | Sistema nervioso | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo P | Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes | Completada | 12/08/2011 |
| Grupo R | Sistema respiratorio | Completada | 18/05/2016 |
| Grupo S | Órganos de los sentidos | Completada | 01/02/2016 |
| Grupo V | Varios | Completada | 01/02/2016 |

Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, [utilice el buscador](#)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo C - Sistema cardiovascular. Subgrupo C10 – Agentes modificadores de los lípidos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 003

Inclusión de nuevos principios activos a 1 de febrero de 2016: Evolocumab.

| SUBGRUPO | P. ACTIVOS | PICTOGRAMA | PROPUESTA REDACTADO |
|---|--------------------------|------------|---------------------|
| C10A: AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS, MONOFÁRMACOS | | | |
| C10AA Inhibidores de la HMG-CoA reductasa | Simvastatina | No | |
| | Lovastatina | | |
| | Pravastatina | | |
| | Fluvastatina | | |
| | Arorvastatina | | |
| | Rosuvastatina | | |
| C10AB Fibratos | Bezafibrato | | |
| | Cemfibrozilo | | |
| | Fenofibrato | | |
| C10AC Secuestradores de ácidos biliares | Colestiramina | | |
| | Colestipol | | |
| | Colextran/ Detraxtran | | |
| | Colesevelam | | |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo C - Sistema cardiovascular. Subgrupo C10 – Agentes modificadores de los lípidos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 003



| SUBGRUPO | P. ACTIVOS | PICTOGRAMA | PROPUESTA REDACTADO |
|--|--|------------|---------------------|
| C10A AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS, MONOFÁRMACOS | | | |
| C10AD Ácido nicotínico y derivados | Nicotínico con laropiprant | No | |
| C10AX Otros agentes modificadores de los lípidos | Triglicéridos omega-3 (ésteres y ácidos) | | |
| | Ezetimiba | | |
| | Sultosilato de piperazina | | |
| | Alipogen tiparvovec | | |
| | Lopitapida | | |
| | Evolocumab | | |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.
Grupo C - Sistema cardiovascular. Subgrupo C10 – Agentes modificadores de los lípidos. Fecha de publicación 01.02.16. Versión 003

| SUBGRUPO | P. ACTIVOS | PICTOGRAMA | PROPUESTA REDACTADO |
|---|------------------------------|------------|---------------------|
| C10B AGENTES MODIFICADORES DE LOS LÍPIDOS, COMBINACIONES | | | |
| C10BA Inhibidores de la HMG-CoA reductasa en combinación con otros modificadores de lípidos | Fenofibrato con simvastatina | No | |
| C10BX Inhibidores de la HMG-CoA reductasa, otras combinaciones | Amlodipino con atorvastatina | No | |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/conduccion/listadosPrincipios/normasListados.htm>)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001

| SUBGRUPO | P. ACTIVOS | PICTOGRAMA | PROPUESTA REDACTADO |
|--|-------------------|------------|---|
| N02A: OPIOIDES | | | |
| N02AA Alcaloides naturales del opio | Dihidrocodeína | Sí | <p>Ficha Técnica (sección 4.7) Los analgésicos opioides pueden disminuir la capacidad mental y/o física necesaria para realizar tareas potencialmente peligrosas (p.ej. conducir un coche o utilizar máquinas), especialmente <al inicio del tratamiento>, <tras un aumento de la dosis> <tras un cambio de formulación> y/o <al administrarlo conjuntamente con otros medicamentos.> Se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si sienten somnolencia, mareo o alteraciones visuales mientras toman X, o hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada.</p> <p>Prospecto Pregunte a su médico si puede conducir o utilizar máquinas durante el tratamiento con X. Es importante que antes de conducir o utilizar máquinas, observe como le afecta este medicamento. No conduzca ni utilice máquinas si siente sueño, mareo, tiene visión borrosa o ve doble, o tiene dificultad para concentrarse. Tenga especial cuidado <al inicio del tratamiento>, <tras un aumento de la dosis>, <tras un cambio de formulación.> y/o <al administrarlo conjuntamente con otros medicamentos.></p> |
| | Hidromorfona | | |
| | Morfina | | |
| | Oxicodona | | |
| N02AB Derivados de fenilpiperidina | Fentanilo | | |
| | Petidina | | |
| N02AC Derivados de la difenilpropilamina | Dextropropoxifeno | | |
| N02AD Derivados del benzomorfanó | Pentazocina | | |
| N02AE Derivados de la oripavina | Buprenorfina | | |
| N02AF Derivados del morfinao | Nalbufina | | |
| N02AX Otros opioides | Tramadol | | |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiquetProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

CORREO ELECTRÓNICO

sdaem@aemps.es

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



| SUBGRUPO | P. ACTIVOS | PICTOGRAMA | PROPUESTA REDACTADO |
|--|---------------|---|---|
| N02B: OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS | | | |
| N02BA Ácido salicílico y derivados | AAS | No | |
| | Etenzamida | | |
| | Fenazona | | |
| N02BB Pirazolonas | Metamizol | Sí | <p>Ficha Técnica (sección 4.7) Aunque no son de esperar efectos adversos sobre la capacidad de concentración y de reacción, a las dosis más altas, dentro de las recomendadas, debe tenerse en cuenta que estas capacidades pueden verse afectadas y se debe evitar utilizar máquinas, conducir vehículos u otras actividades peligrosas. Esto es especialmente aplicable cuando se ha consumido alcohol.</p> <p>Prospecto Aunque no son de esperar efectos adversos sobre la capacidad de concentración y de reacción, a las dosis más altas, dentro de las recomendadas, debe tenerse en cuenta que estas capacidades pueden verse afectadas y se debe evitar utilizar máquinas, conducir vehículos u otras actividades peligrosas. Esto es especialmente aplicable cuando se ha consumido alcohol.</p> |
| | Propifenazona | Dependerá de los principios activos incluidos en la combinación | |
| N02BE Anilidas | Paracetamol | No | |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001



| SUBGRUPO | P. ACTIVOS | PICTOGRAMA | PROPUESTA REDACTADO |
|--|------------------|------------|--|
| N02B: OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS | | | |
| N02BG Otros analgésicos y antipiréticos | Clonixino lisina | No | |
| | Ziconotida | Sí | <p>Ficha Técnica (sección 4.7) X puede provocar confusión, somnolencia, mareo y otras reacciones adversas neurológicas, por lo que se debe aconsejar a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si notan algún efecto.</p> <p>Prospecto Se ha comunicado que el uso de X puede provocar confusión y somnolencia. Consulte con su médico antes de conducir o de utilizar maquinaria.</p> |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)



LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS E INCORPORACIÓN DEL PICTOGRAMA DE LA CONDUCCIÓN.

Grupo N - Sistema nervioso. Subgrupo N02 - Analgésicos. Fecha de publicación 02.06.10. Versión 001












| SUBGRUPO | P. ACTIVOS | PICTOGRAMA | PROPUESTA REDACTADO |
|---|--------------------|------------|---|
| N02C: PREPARADOS ANTIMIGRAÑOSOS | | | |
| N02CA Alcaloides del cornezuelo | Dihidro ergotamina | No | Ficha Técnica (sección 4.7) Debe tenerse en cuenta que algunos síntomas, como somnolencia, mareos y debilidad, causados por la propia crisis migrañosa, pueden afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. |
| | Ergotamina | | Prospecto Este medicamento puede producir mareos. Debe tener en cuenta que algunos síntomas, como somnolencia, mareos y debilidad, causados por la propia crisis migrañosa, pueden afectar a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. |
| N02CC Agonistas selectivos de serotonina (5-HT ₁) | Almotriptan | Sí | Ficha Técnica (sección 4.7) La migraña o el tratamiento con X pueden producir somnolencia. Se debe recomendar a los pacientes que valoren su capacidad para realizar tareas complejas, tales como conducir, durante las crisis de migraña y tras la administración de X. Prospecto Este medicamento al igual que la migraña puede causar somnolencia. Si nota estos efectos evite conducir o utilizar máquinas ya que puede ser peligroso. |
| | Eletriptan | | |
| | Frovatriptan | | |
| | Naratriptan | | |
| | Rizatriptan | | |
| | Sumatriptan | | |
| Zolmitriptan | | | |
| N02CX Otros preparados antimigrañosos | Pizotifeno | Sí | |

Nota: Ver normas generales de interpretación de los listados (<http://www.aemps.es/indFarma/etiqueProspectos/conduccion/normasListados.htm>)

CRITERIOS PERSONALES

| | |
|---------|---------|
| APTITUD | no apto |
| | apto |

| | | CARRETILLAS |
|---|--------------------|---|
| vertigos | tratamiento actual |  |
| | antecedentes |  |
| psicofármacos | < 3 meses |  |
| | > 3 meses |  |
| adiadococinesia dedo nariz babinski weill | alterados |  |
| visión monocular | < 1 año |  |
| | > 1 año | |
| hipoacusia severa | |  |
| embarazo | < 4º mes |  |
| | a partir 4º mes | |
| DMID con antecedentes hipoglucemia | |  |

Matrici S.Coop.



Matrici S.Coop.

JUL 2016

El trabajo en equipo
DIVIDE el esfuerzo y
MULTIPLICA los resultados





MUCHAS GRACIAS



Dr. Alberto Pascual Izaola
Responsable SSL Matrici S.Coop.
T 688 806035 apascual@matrici.com